



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Departamento de Matemáticas
Puras y Aplicadas
Septiembre - Diciembre 2007

Nombre: _____

Carnet: _____ Sección: _____

2do. Parcial de Matemáticas I (Recuperación)

1. (5ptos c/u ptos.) Resolver:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2 + x - 1} - \sqrt{2x^2 - 3x})$

(b) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3(t)}{\operatorname{sen}^2(t)}$

Sugerencia: en (b) considere que para cualesquiera a y b se tiene: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Soluciones:

(a)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2 + x - 1} - \sqrt{2x^2 - 3x}) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2 + x - 1} - \sqrt{2x^2 - 3x}) \frac{(\sqrt{2x^2 + x - 1} + \sqrt{2x^2 - 3x})}{(\sqrt{2x^2 + x - 1} + \sqrt{2x^2 - 3x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x - 1}{\sqrt{2x^2 + x - 1} + \sqrt{2x^2 - 3x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{1}{x}}{\sqrt{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} + \sqrt{2 - \frac{3}{x}}} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3(t)}{\operatorname{sen}^2(t)} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(t))(1 + \cos(t) + \cos^2(t))}{\operatorname{sen}^2(t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(t))}{t^2} (1 + \cos(t) + \cos^2(t)) \frac{t^2}{\operatorname{sen}^2(t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} (1 + \cos(t) + \cos^2(t)) \cdot \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(t)}{t} \right)^{-2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

2. (9 ptos.) Considere la función:

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)^2 - 1 & \text{si } x \leq -\frac{3}{2} \\ \text{sen}(\pi x) & \text{si } -\frac{3}{2} < x \leq \frac{3}{2} \\ 4x + b & \text{si } x > \frac{3}{2} \end{cases}$$

Encuentre los valores de a y de b para que la función sea continua en los puntos $x = -\frac{3}{2}$ y $x = \frac{3}{2}$

Solución:

(I) Continuidad en $x = -\frac{3}{2}$

Hay que exigir que:

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^-} f(x) = f\left(-\frac{3}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^+} f(x)$$

Veamos:

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^-} ((x-a)^2 - 1) = \left(-\frac{3}{2} - a\right)^2 - 1 = f\left(-\frac{3}{2}\right) = a^2 + 3a + \frac{5}{4}$$

y

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^+} \text{sen}(\pi x) = \text{sen}\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 1$$

Luego:

$$a^2 + 3a + \frac{5}{4} = 1 \Leftrightarrow a^2 + 3a + \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow a = \frac{-3 \pm \sqrt{(3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4}}}{2} = \frac{-3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$$

(II) Continuidad en $x = \frac{3}{2}$

Hay que exigir que:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^-} f(x) = f\left(\frac{3}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} f(x)$$

Veamos:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^-} \text{sen}(\pi x) = \text{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) = -1$$

y

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} (4x + b) = 4\left(\frac{3}{2}\right) + b = 6 + b$$

Luego:

$$6 + b = -1 \Leftrightarrow b = -7$$

Finalmente los valores pedidos son $a = \frac{-3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$ y $b = -7$


3. (9 ptos.) Considere la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 3 & \text{si } x \geq 1 \\ \frac{x+3}{2} & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

- (a) Grafique f . Diga dominio y rango.
 (b) Diga si f es inyectiva. Justifique.
 (c) En caso de ser f inyectiva, calcule su inversa f^{-1} y diga su dominio y su rango.

Solución:

- (a) Llamemos $f_1(x) = x^2 - 2x + 3$ y $f_2 = \frac{x+3}{2}$
 Entonces $Dom(f) = Dom(f_2) \cup Dom(f_1) = (-\infty, 1) \cup [1, \infty) = \mathbb{R}$,
 $Rgo(f) = Rgo(f_2) \cup Rgo(f_1) = (-\infty, 2) \cup [2, \infty) = \mathbb{R}$
 y la gráfica de f queda así:



- (b) De la gráfica de f podemos decir que cualquier recta horizontal la corta en exactamente un punto, luego f es inyectiva, y por tanto f_1 y f_2 también lo son.
 (c) Hay que calcular las inversas de f_1 y f_2 . Veamos:

$$y = f_1(x) = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2 \Leftrightarrow$$

$$y - 2 = (x-1)^2 \Leftrightarrow x-1 = \sqrt{y-2} \text{ pues } x \geq 1 \Leftrightarrow x = \sqrt{y-2} + 1 = f_1^{-1}(y)$$

Luego: $f_1^{-1}(x) = \sqrt{x-2} + 1$, $Dom(f_1^{-1}) = Rgo(f_1) = [2, \infty)$, y $Rgo(f_1^{-1}) = Dom(f_1) = [1, \infty)$
 Por otro lado:

$$y = f_2(x) = \frac{x+3}{2} \Leftrightarrow$$

$$2y = x+3 \Leftrightarrow x = 2y-3 = f_2^{-1}(y)$$

Luego: $f_2^{-1}(x) = 2x - 3$, $Dom(f_2^{-1}) = Rgo(f_2) = (-\infty, 2)$, y $Rgo(f_2^{-1}) = Dom(f_2) = (-\infty, 1)$
Finalmente:

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{x-2} + 1 & \text{si } x \geq 2 \\ 2x - 3 & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

y $Dom(f^{-1}) = Rgo(f) = \mathbb{R}$, $Rgo(f^{-1}) = Dom(f) = \mathbb{R}$

4. (7 ptos.) Considere la función:

$$f(x) = \begin{cases} \tan^2(x-2) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x-2}\right) & \text{si } x \neq 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

Solución:

Tenemos que $-1 \leq \operatorname{sen}(\alpha) \leq 1$ para cualquier α , luego, si $x \neq 2$ entonces:

$$-1 \leq \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x-2}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -\tan^2(x-2) \leq \tan^2(x-2) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x-2}\right) \leq \tan^2(x-2)$$

Como:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (-\tan^2(x-2)) = \lim_{x \rightarrow 2} (\tan^2(x-2)) = 0$$

Entonces por el teorema del sandwich podemos concluir que:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \tan^2(x-2) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x-2}\right) = 0 = f(2)$$

Lo cual termina la demostración.

¡Justifique todas sus respuestas!